
Subject: Shockloss

Posted by [New11](#) on Sun, 10 Dec 2017 22:44:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo liebes Forum,

muss man bei einer 2. HT zwingend mit Shockloss rechnen ?

Zu mir:

Ich hatte eine HT vor 2 Jahren Fue 3500 Grafts. Davor Nw5a (außer an den oberen Seiten) relativ kahl. Jetzt Nw 4. (hinten der Kranz und in der oberen vorderen Mitte relativ Licht)

Mir wurde bereits damals gesagt das ich an einer 2. HT nicht vorbei komme. Nur möchte ich ungern, auch wenn es nicht perfekt ist, die erste HT ruinieren bzw das native Haar falls vorhanden.

Danke für eure Antworten.

Subject: Aw: Shockloss

Posted by [schlimm](#) on Sun, 10 Dec 2017 22:50:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Shockloss bezieht sich meist auf die schwächsten Haaren die so oder so bald ausgefallen wären.

Shockloss auf einem gesunden Areal ist meistens komplett reversibel.
Natürlich kann dir eine schlechte Klinik der Donor komplett zerbohren.
Dass die Haare aus der 1 OP irreversibel ausgehen wird kaum passieren.

In welcher Klinik warst du denn? 3500 Grafts sind ja eine moderate Menge daher denke ich dass dein Arzt schon aufpasst , dass er dir den Donor nicht versiebt.

Subject: Aw: Shockloss

Posted by [New11](#) on Mon, 11 Dec 2017 23:23:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich war bei Dr bicer. Der donor wurde verschont und habe noch Reserven. Will sie mir natürlich nicht verschießen wenn die ersten 3500 um sonst waren.

Man liest hier sehr oft 1. op kein Shockloss 2. sehr stark. Deshalb dachte ich da gibt es einen Zusammenhang .

Jemand Erfahrung mit einer 2. HT ?
