
Subject: Empfindlichkeit des Empfängerbereichs
Posted by [120secX](#) on Thu, 18 Apr 2019 19:59:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Freunde,

Ich hatte am 28.03.2019 meine Haartransplantation (FUE in Frankfurt am Main). Ich habe mir meine Geheimratsecken mit ca. 2100 Grafts auffüllen lassen und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Jetzt bin ich 20 Tage post OP aus Versehen mit dem Empfängerbereich gegen die Sonnenblende im Auto gekommen.
Hat nicht wehgetan ... ist auch nichts zu sehen.

Man sagt ja, nach 14 Tagen kann den Grafts nichts mehr passieren ... müsste man sich den Kopf schon blutig schlagen, dass die Transplantate beschädigt werden können ? oder wie merkt man, dass Sie Schaden genommen haben ?

Sry wenn die Frage evtl. blöd ist, aber ich behandel meinen Kopf noch immer wie ein rohes Ei und bin noch extrem penibel !

Vielen Dank schonmal !

Beste Grüße

Subject: Aw: Empfindlichkeit des Empfängerbereichs
Posted by [Kyniker](#) on Fri, 19 Apr 2019 05:54:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Da ist absolut nix passiert. Kenne die Übervorsichtigkeit.

Subject: Aw: Empfindlichkeit des Empfängerbereichs
Posted by [120secX](#) on Fri, 19 Apr 2019 10:32:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die Antwort !

Ja, das ist bei vielen bestimmt ähnlich. Ich bin noch immer übertrieben vorsichtig (traue mich noch nicht mal auf der Seite zu schlafen :lol:)

Was müsste denn passieren, dass Grafts, 2 Wochen nach der OP, beschädigt werden können ?

Das müsste man doch eigentlich merken oder ...

Gruß

Subject: Aw: Empfindlichkeit des Empfängerbereichs
Posted by [LabraThor](#) on Fri, 19 Apr 2019 12:58:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fußball gegen den Kopf, Kontaktsport, skiweitsprung und mit dem Gesicht bremsen, gegen einen Türrahmen laufen, sich ne Stunde auf die Sonnenbank legen... ach mir fällt da viel ein,

Subject: Aw: Empfindlichkeit des Empfängerbereichs
Posted by [krx](#) on Fri, 19 Apr 2019 13:16:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dass was normalen Haaren auch schaden würde...

Subject: Aw: Empfindlichkeit des Empfängerbereichs
Posted by [120secX](#) on Fri, 19 Apr 2019 15:39:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für eure Antworten ...

Naja ... Kopfbälle schädigen Haare unter normalen Umständen ja eher weniger ... deshalb meine Frage.

Wie kann man das deuten ?

Ps: Ich habe mittlerweile sehr trockene Kopfhaut im Empfängerbereich. Ich habe von Eucerin so eine panthenolhaltige Körperlotion. Kann ich die bedenkenlos verwenden ?

Gruß

Subject: Aw: Empfindlichkeit des Empfängerbereichs
Posted by [LabraThor](#) on Fri, 19 Apr 2019 16:16:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du machst dir zu viele Gedanken ;) wenn die grafts ausfallen blutet es auch Normalerweise. Jetzt sind sie fest und sollten wirklich nur noch bei massiver Gewalt oder Verletzung ausfallen. Meine Beispiele waren eher auf die Phase 3-10 Tag bezogen.

Kannst du machen, Aloevere eignet sich auch

Subject: Aw: Empfindlichkeit des Empfängerbereichs
Posted by [120secX](#) on Fri, 19 Apr 2019 21:09:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok Danke ... meine Klinik hat mir auch ein Aloe Vera Gel empfohlen.

Noch mal zur trockenen Kopfhaut.

Ist es normal, dass es im Empfängerbereich zu Schuppenbildung kommt ? Also nicht so fettige Schuppen, sondern höchstwahrscheinlich aufgrund der Trockenheit.

Gruß
