
Subject: Bräuchte eure Hilfe!

Posted by [ronnie](#) on Thu, 13 Sep 2007 17:52:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

ich bin neu hier und habe schon viel im Internet durchgelesen über Haarausfall. Jetzt bleiben aber noch ein paar Fragen offen, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt.

Ich hatte schon Minoxidil / Regaine ausprobiert, aber davon irgendwie unerträgliche Magenschmerzen bekommen. Nachdem ich es wieder abgesetzt hatte, verschwanden die Schmerzen. Habe in Foren davon noch nichts gelesen, nur dass manche einen niedrigen Blutdruck bekommen. Hatte jemand schon die gleichen Erscheinungen?

Da ich Minoxidil abgesetzt habe, habe ich mir ein Rezept für Propecia geholt. Jetzt wollte ich mich bevor ich was kaufe nochmal genauer informieren. Ich wollte mir für das Rezept Proscar holen und die Tabletten vierteln. Wie macht ihr das? Macht ihr das selber oder lasst ihr das von der Apotheke machen. Ich habe mal in der Apotheke nachgefragt und sie würden ca. 60 € dafür verlangen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Proscar oder Propecia kaufen soll und wie ich es eventuell teilen soll? Hoffe dabei kann mir jemand helfen.

mfg
ronnie

Subject: Re: Bräuchte eure Hilfe!

Posted by [Homers](#) on Thu, 13 Sep 2007 17:58:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)


Stichwörter für die suchfunktion

proscar teilen, fin teilen, in 4 stücke teilen, in 5 teilen, in vier teilen, in fünf teilen, mörser, rasierklinge, messer, finasterid, teppichmesser, wirksamkeit, verlieren, knubbel, zerteilen

File Attachments

1) [splitproscarce7.jpg](#), downloaded 724 times

Cutting Proscar into 5 relatively equal sized pieces



Subject: Re: Bräuchte eure Hilfe!

Posted by [ronnie](#) on Fri, 14 Sep 2007 18:06:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann mir da nicht noch jernad kurz was zu schreiben, ob man Proscar was falsch machen kann und warum Minoxidil so Nebenwirkungen hatte?

Subject: Re: Bräuchte eure Hilfe!

Posted by [stef84](#) on Sun, 16 Sep 2007 12:15:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei Proscar kann man nix falsch machen! Und nein, die Wirkung hebt sich nicht auf, weil die Schutzschicht zerstört wird (falls die Frage jetzt kommen sollte)! Es ist auch egal, ob die Fragmente exakt gleich groß sind!

Warum du jetzt NW hattest kann dir natürlich niemand sagen. Dass mit Magenschmerzen von Minox hab ich aber noch nie gehört! Vielleicht war es ja echt Zufall! Wie lang nahmst du Minox und wie lang waren die Magenschmerzen da? Vielleicht nochmal probieren?

Subject: Re: Bräuchte eure Hilfe!

Posted by [ronnie](#) on Sun, 16 Sep 2007 12:44:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich habe es ca. 2 Monate genommen und dann fingen die NW an. Ich hatte dann ungefähr alle 3 - 4 Tage für ca. 2 Stunden so extreme Bauchschmerzen, dass ich kaum noch laufen konnte. Ich habe das dann noch 2 Wochen durchgemacht, aber als es nicht aufgehört hat, habe ich es abgesetzt und danach war auch wieder alles normal. Ich habe eigentlich nie Probleme mit meinem Bauch und Magenschmerzen eigentlich nie und wenn nur ganz leicht. Daher war meine Vermutung, dass es davon kommt. Habe auch noch etwas nachgeforscht, aber niemand hatte das gleiche Problem. Ich kann mir nur vorstellen, dass es an meinem Blutdruck gelegen hat. Habe gelesen, dass der runtergehen soll bei manchen bei Einnahme von Minoxidil und ich schon immer einen niedrigen Blutdruck habe.

Danke für die Info. Werde morgen mit Proscar anfangen und schauen wie es wirkt und dann vielleicht nochmal Minoxidil zusätzlich testen. Wenn die NW wieder kommen, dann weiß ich wenigstens, dass ich es nicht vertrage.

Subject: Re: Bräuchte eure Hilfe!

Posted by [stef84](#) on Sun, 16 Sep 2007 13:40:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ronnie schrieb am Son, 16 September 2007 14:44Also ich habe es ca. 2 Monate genommen und dann fingen die NW an. Ich hatte dann ungefähr alle 3 - 4 Tage für ca. 2 Stunden so extreme Bauchschmerzen, dass ich kaum noch laufen konnte. Ich habe das dann noch 2 Wochen durchgemacht, aber als es nicht aufgehört hat, habe ich es abgesetzt und danach war auch wieder alles normal. Ich habe eigentlich nie Probleme mit meinem Bauch und Magenschmerzen eigentlich nie und wenn nur ganz leicht. Daher war meine Vermutung, dass es davon kommt. Habe auch noch etwas nachgeforscht, aber niemand hatte das gleiche Problem. Ich kann mir nur vorstellen, dass es an meinem Blutdruck gelegen hat. Habe gelesen, dass der runtergehen soll bei manchen bei Einnahme von Minoxidil und ich schon immer einen niedrigen Blutdruck habe. Danke für die Info. Werde morgen mit Proscar anfangen und schauen wie es wirkt und dann vielleicht nochmal Minoxidil zusätzlich testen. Wenn die NW wieder kommen, dann weiß ich wenigstens, dass ich es nicht vertrage.

Ja, genau so würde ich es machen. Aber dann nur eins nehmen. Also entweder Fin oder Minox um die Wirksamkeit zu testen
